doctoriminated

Chardonnay 1



199MTP29



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s316-320 199Mtp29

2 Chardonnay 8 9 s. 3 1 6. 3 5 0.

20-15AZ.



Désignation: Chardonnay 1 Clos 10 Planche 15 Rang A Souche 2 Vigueur : Date de Véraison: 31-7-64 Date de Maturité: 24.764 +2 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - D - L - M - Q Pédoncule : L - M - 6) BAIE : TG - G - M- P. 13413 (81) - Gr - Rs - Rg - N. s 12 Saveur : 8 - m - ar - fox - herb. disc. - sph. - cll. - Ov. s 23 s 34 Obov. - cyl. - fus. s 43 avec pépins - apyrène s 52 jus : (ino. - coloré Miller: (0) | 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation: Chardonnay 1 5 Closic planche / S Rang / Souche 2 Vigueur : 3 Date de véraison : 3/7 65 Date de maturité : 18.8.65 0 Pourriture: 1 GRAPPE - G - M - D - L - M - C BAIE: TG - G - M - P. (Bl.) - Gr - Rs - Rg, - N . Charge saveur : (8) m - ar - fox - herb. s 1 / dis. - sph. - ell. - 0y. Obov. - cyl - fus. -B 23 avec papins - apyrene 837 jus : inc. - coloré 9 4 4 854 Pédoncule : L- M- 🔘

DESIGNATION : chardonnay 1 CLOS JOFLANCHE | S RANG | SOUCHE 2 Vigueur : 3,1 Port : (érig) - 1/2 érig - couché. Date de Véraison: 26-7.66 Date de Maturité : 30-8 66 + 3 Fourriture : 0,5 Pédencula : MC Millerancege : O GRAPPE: 4 - M - D: L - M - C. BAIE : TG .. G - M - P. disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : RD - Gr - Rs - Rg - N: Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 18 s 26 3 3 4 4 5 4 avec pepins - apyrène. Jus inc - coloré

Année: 1964

Explacement 10.15. A. 2... Désignation Chardennay 1...

		Nombre total	: 26.3	!	!!!	!	!	!	!	1
ar who we	1	! 7_	! 4	!	!	!	!	1	1	1
		i	i t	1	į	î	!	!	!	;
	2	! 5	! 4	× !	!	!	!	!	!	:
		!	1	!	!	:	1	:	:	;
	3	! 5	! 4	L:	1	:		į	i	i
		1	!			:		;	i	i
	4	! +	14	× :	1	;	i	i I	1	į
	_	1	1 2	1	:	1	1	i	- 1	1
	5	. 4	13		,	1		i	į	1

Année: 1965

Biplacement. M. 15. A. 2.... Désignation . Chardonnay 1

	Hombre total	!			The second secon	and the second s		
		127.31	31.3 !	- ! !	!	!!	!	!
d d	1 3	1 1 1 1	9 4 !	!	!	!	!	1
	1 -	1 -1	0	ţ	1	!	!	1
2	5	il i	0 1	1	1	1	1	1
-		1 1	2	i	1	1	1	1
7	; 4		4 1	i	1	1	1	1
)	1	; 1 ;	1 ;	i	1	1	1	!
	1		2	i	1	1	!	!
4	9	· Lxi	2 x	i	1	i	1	1
_	1 7.			1	i	i	1	-1
5	! 4	1 1	2 1	:	;	i	1	1

D le 31.3.65 x +3

And American de la seconda de con-	! Nombre	. The second was seen as the second constant $X = X = X = X = X = X = X = X = X = X $							1
!	total	1 423	115.3	1 ! 1 1	!	!!	!	1	!
1 1	! 6	: 2	: 3 N	1	!	1	!	!	!
1 2	1 4	3 *	13 ×	!!!!	1	66	;		1
1 3	1-1	4	! 5	! !	2! 13	1	1		!
1 4	14	1 4	13x	15	1 + 3	!	!!!		!
. 5	4	! 4	13 4	Die		1		1 1	1

Désignation: chardonnay 1

VASSAL 10 Planche 15 Côté A2 Nº Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen (2) globuleux 3.
- 41 glabre 4 sáteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 4 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duvoteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6,64

No ordre

Désignation: chardonnay 1

VASSAL 10 Planche 15 côté AlNº souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3, révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc D- Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4- Jaune 5 à plages pronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 céteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (5)

(F) RIMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 0 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 0 cotonneux 1,
 - entièrement & partiellement 2

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros i moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation: chardonnay 1

Clos 10 Planche 15 Côté A2 Rang souche I 23 4 5

(F) RAPTEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (I)- à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

- noeuds 5I

: verte [] - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 78 - Femelle 9.

Calvo 6, 84

Nº ordre

Désignation

Chardonnay 1

Clos 10 Planche 15 Côté A rang

rang 2 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan I en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté (5)
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
 - supérieur à 90º 3.

 angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I égal à 90º 2 supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement: 10.15 A2

Désignation: chardennay

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne &- Petite (3) Many

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 67

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinéc 7 - pruinéc 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4)- épaisse 5:

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - Do séparation facile (égreneuse) (4) - difficile 2.

Calvo 8.64

chardanay 1. Planche coté . 1. 15. A. 2. Rang souche 1-2-3-4-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). wayer: : ramifié (†), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

; glabre (2), à épines ou analogues (3), à reils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotenneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme ((), à raies (24, bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeur : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

```
Emplacement: dos 10 pl 15 A2
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 6) - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ...... 0-2-3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L<sup>1</sup><sub>3</sub> ..... 1) - 2 - 3.
                 ..... (1)-(2)-3-4-5.
22 - Largeur S.P.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                           : (1) - (2) - 3.
                  Direction
                        : 4 - 5.
                  Forme
                  Médiane/Base : 6 - (7 - (8)
```

Nº d'ordre: 0199-23 Désignation: Chardonnay nº 1

Origine :

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2015

Observateur:

CodeVar: 199 CodeIntro: 199Mtp29

Nom Var : Chardonnay

Emplacement: Vass2R09s316-320

90%								
PH	16	N	O	۱.	O	C	1	H

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou faible	moyenne	élevée ou très élevée	
-					-

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8	24/3	31/2 4dib.	2)	
2	TF			`	\
3	4	20/3	27/3	2	
4	4	20/3	24/3	0	
5	4	Dune!	24/3	2	
Moyenne	20	1	27/03 -1	6	3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
1815	2215-2		16/07	23/07+1	24/08 +2	

20/07 toujours DV. 79 bais tendes

SHIVI DE MATURITE

Dates	10/8	11/8	24/01-	
IR	190	18,8.19	Bon ig . Sta	
Valeur papier PH				

Remarque: 10/8: ercer ceide.

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement) Observateur : B. GENNA

Année: 2014 Code cépage: Chardonna/ Nom introduction:

Code introduction: 23

Emplacement: 2 R9 \$316.320

]	PH	EN	OL	OG	IE
0-15	1	17	100		- 817

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant	absent ou	faible	movenne	forte	très forte
OIV 332	rognage, ou maturité)	très faible.	laible	moyenne	TOTIC	tres toric

RESISTANCE

0: 450	Description of the second	très faible ou	**********	élevée ou très
O1V 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe	faible	moyenne	élevée

0 1	Nombre de	Date de d	ébourrement	Nbre grappes	Fertilité
Souche	bourgeons	début	moitié (oiv 301)	(oiv 153)	(grappes/10 yeux)
1		08/03(E)			
2					
3					
4					
5					
Moyenne		08/03 (E)	11/036		

Date	floraison	Taux de	Date de	véraison	Date de	Début
début	moitié (oiv 302)	nouaison % (oiv 501)	début	moitié (oiv 303)	maturité (oiv 304)	aoûtement (oiv 306)
10/05	15/056		16/07	21/07	25/08/140	

SUIVI DE MATURITE

Dates	11/08	18/08	25/08				
IR	18°3	20.45	21°4				
Valeur papier PH							

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2013

Observateur:

CodeVar: 199

CodeIntro: 199Mtp29

Nom Var: Chardonnay

Emplacement: Vass2R09s316-320

	Pi	HENOLOGIE				
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE Oiv 351 vigueur rameaux (floraison) très faible. Faible Moyenne Forte Très forte croissance prompts-bourgeons (avant absent ou Oiv 352 Faible Moyenne Forte Très forte rognage, ou maturité) très faible.

RESISTANCE très faible ou élevée ou Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe moyenne faible très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9		1913	M	
2	TF	\	\	_	
3	10		2013	11	
4	C		21.13	0	
5	7		2013	0	
Moyenne	32		20/3 -4	22	7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
30.05	03/06-2		31/52	06/08+2	16:09 12:22 +1	

Et l'étalmité of

SULLI DE MIVIE	PULLE			
Dates	30.08	02,09	20.179	12.09
IR	20	20,500	e21	21
Valeur papier PH		1		

Remarque:

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012

Observateur:

Code introduction: 199Mtp29 Nom introduction: Chardonnay

Emplacement: Vass2R09s316-320

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou faible moyenne	élevée ou très élevée
---	-------------------------------	--------------------------

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8		19/3	1	
2				1	
3	8		26/3	12	
4	4		1613	1	
5	4		1913	3	
Moyenne	24		2013 -9	28	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
21.05.	25.05-4			28.07	30.08_	

Remarque: 18.07.12 oidium 1/6 - 1/4 1 bise tendre

20.07 por Effets

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011

Observateur:

Code introduction: 199Mtp29

Cépage : Chardonnay Code Nom introduction : Chardonnay 1

Emplacement: Vass2R09s316-320

79/7%						
121		D. L.	$^{\circ}$	100	CIT	177
PF	H.		ш	39. F	C T	10.

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenn e	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtr e	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv. 450	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe	très faible ou	movenne	élevée ou
ON 459	Degre de resistance bon yus grappe	faible	moyenne	très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
Taille Dong	10	21/26/2013	16/3	18	
2 0					
3	12	10/3 3db e 113	18/3 7 AND MIZ	14	
4	13	= 7/3 5db 0 113	17/3	22	
5	12		616 M/3	lo	
Moyenne	47		16/3-1	64	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
06.06.11	11.05-3		15.03	23-07+1	18.08.0	

2-05-11 Utos		Sui	VI DE MATURIT	E	 -	
Dates	19-09					
IR	27 - 19.19.					
Valeur papier PH						

Remarque: DV: lin L 30.06. Lien le 06.07
20-07-19. 20 per mais poole MV Revent de Rose.
18-08: 4 de charge que la précédent de avancé mais qu' m DM

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2010

Observateur:

Code cépage: 0199

Code introduction: 29

Nom introduction : Chardonnay B

Emplacement: Vass2R09s316-320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 -

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	7	2165 3	26/3		
2	tote desolo				
3	8	23/3	26/3		
4	9		23/3		
5	4		23/3		
Moyenne			25/3 -4		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
25/05	27/05		26/07	2/08+2	27/08	
	1				0	

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2009

Code cépage: 0199

Observateur:

Nom introduction: Chardonnay B

Emplacement: Vass2R09s316-320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

Code introduction: 29

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5	12/3	1913	7	
2	5	1213	19/3	0	
3	5	3/3	12/3	0	
4	5	12/3	1613	4	
5	7	9/3	16/3	B	
Moyenne	27		16/3-1	11	4

Date de début	floraison moitié	Taux de nouaison	Date de début	véraison moitié	Date de maturité	Début aoûtement
	(oiv_302)	% (oiv 501)		(oiv 303)	(oiv 304)	(oiv 306)
1915	92/5			まりして	25/8+1	

21 212 A 312 Mais A > (45)

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Observateur:

Année :2008 Phéno CodeIntro : 199Mtp29

NomVar: Chardonnay

Nom introduction: Chardonnay 1

Emplacement: Vass2R09s316-320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9		4/3	10	
2	7		4/3	0	
3	7		4/3	6	
4	6		4/3	7	
5	7		4/3	3.	
Moyenne	36		4/3	26	7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
15/5	21/5		24/07	31/07	20/08	
-	P HE & 1915		\	1+1	11	

-3

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2007

(2007

Observateur:

Code cépage: 0199

Code introduction: 29

Nom introduction: Chardonnay B

Emplacement: 02R09S316.320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Chico

Pical

Sou	che	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	1	H		7/3	5	
2	2	4	26/2	5 3	0	
. 3		4 26	gunfle	7/3	6	
4		2	10/2	12/3- 15/3 toursupe & souls	0	
5	5	5	26ks onlle	5 3	1	
Moye	enne	19	11	7/3	12	6
				. 9		

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	16/5		12/7	20/7+1	14/8.	
	-3		(00 DV. 4/7	II	R=21-19,5	

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2006

Code cépage: 0199

Code introduction: 29

Nom introduction: Chardonnay B

Observateur:

Emplacement: 02R09S316.320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	+	23/3	27/3	8	
2	4	21/3	23/3	3	
3	3	21/3	2713	1	
4	en Comution		2713	4	
5	6	23/3	2713	3	
Moyenne	26		26/3	19	7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
13/5	24/5-2		24/7	31/7+2	16/8 +1	

Affen ouverte & 5 le 18/5 proche MF 22/5

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2005

Observateur:

Code cépage: 199 Code introduction: 29

Nom introduction: Chardonnay B

Emplacement: 02R09S316.320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	22/3	30/03	2 Graffes South South	
2	4		30/3	2	
3	4		30/3	4	
4	Phe				
5	4	30/36	0/04	1	
Moyenne	18		31/3	9	5

-2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/5	30/5		2407	31/07	22/08	
	(80 y 35)	1		0	TE - 22 0 28/2	

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2004

Observateur:

Code cépage: 139 Code introduction: 29
Nom introduction: Chardon ay B

Emplacement: 2R 3 18 316-320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oïv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4 fle		18/03	1	
2	4		18/03	1	
3	2	ь.	25/03	0	
4	fle-				
5	4		15/03	4	
Moyenne	14		19.3.04	6	

- 2

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
2/06	4/6		28/7	218	24/8	

+1

1 0

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2003

Code cépage: 199 Code clone: 29 Nom cépage: Chardonnay B

Observateur:

Emplacement: 2 R3 1316-320

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entre nœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe: très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)	
1	fble				q.	
2	Н	25.3	28.3	1		
3	fole					
4	fble					
5	5	17.3	25-3	2		
Moyenne	9		26.3.03	3	3	

+2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles
23/05	30-05		15/7	117	13-8		

+3

(débourrement; floraison; véraison; maturité; aoûtement)

2002 Année

Observateur

Code cépage: 0199 Code clone: 29

Nom cépage: chardonnay B. Emplacement 2 Rg s, 316-320

Phénologie

oiv 301 époque du hourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	+			1	
2	Н	8.3	14-3	9	5
3	fble				
4	fle				
5	3	8-3	11.3	9	7
Moyenne	7		M.3.02	4	6

-3

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	23/05	27/05		177	2217	25/7	3018	

Formulaire de description 3/8 (stade floraison)

Année: 2005

Observateur: St.

Code cépage :

Code introduction: Nom introduction: Chardennay

Emplacement: 2R9 s 316-320

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3) horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3, oiv 010 couleur face ventrale noeuds: yerte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte 9

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1- présence 9. oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte 9.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1) présence 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins 1) subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence: jusqu'au 4° noeud(1) - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4. oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 - présence 9.

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison): très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%)(5)- élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 -aucune(3.)

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4.

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3.

I.N.R.A. - Domaine de Vassal - version 2003

Formulaire de description 2 / 8 (stade floraison)

Année: 2005

Observateur: &

Code cépage :

Code introduction:

Nom introduction: Chardon new 1

Emplacement: 2R9 & 316-320

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absented) - en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille): nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

notée :)

Densité poils couchés face inf. :nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212) autre 213. (Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.